

CA Oral Probiotic

Recommended use: Source of three probiotic strains / **Usage recommandé :** Source de trois souches de probiotiques.

Adults and Children 12 and Over: Allow one lozenge to completely dissolve in mouth after brushing teeth at night. Take once daily. For best results, move lozenge around mouth and gums while lozenge dissolves, and do not eat or drink for 30 minutes after lozenge dissolves. If you are taking an antibiotic(s) or antifungal(s), take at least 2–3 hours before or after the antibiotic or antifungal. / **Pour adultes et enfants de 12 ans et plus :** Faire dissoudre complètement une pastille dans la bouche après le brossage des dents le soir. Utiliser une fois par jour. Pour de meilleurs résultats, faire circuler la pastille dans la bouche et sur les gencives pendant la dissolution, puis ne pas manger ou boire pendant 30 minutes. Prendre au moins 2 à 3 heures avant ou après la prise d'un antibiotique ou d'un antifongique.

Each Tablet Contains:

1 billion CFU / 1 milliard d'UFC

Chaque comprimé contient :

Medicinal Ingredients

Pediococcus acidilactici CECT8633[‡]

333 Million CFU

Pediococcus acidilactici CECT8633[‡]

Lactobacillus brevis CECT7480[‡]

333 Million CFU

Lactobacillus brevis CECT7480[‡]

Lactobacillus plantarum CECT7481[‡]

333 Million CFU

Lactobacillus plantarum CECT7481[‡]

Ingrédients médicinaux

Non-Medicinal Ingredients: Sorbitol, Guar Gum, Mint Flavour, Magnesium Stearate. / **Ingrédients non médicinaux :** Sorbitol, gomme de guar, arôme de menthe, stéarate de magnésium.

If you have fever, vomiting, bloody diarrhoea, or severe abdominal pain, consult a health care practitioner prior to use. If symptoms of digestive upset (e.g. diarrhoea) occur, worsen, or persist beyond three days, discontinue use and consult a health care practitioner. If you have an immune-compromised condition (e.g. aids, lymphoma, patients undergoing long-term corticosteroid treatment), do not use this product. Not for use ages 6 and under. / En cas de fièvre, vomissement, diarrhée sanglante ou douleur abdominale aiguë, consulter un praticien en soins de santé avant d'utiliser ce produit. Si des symptômes de troubles digestifs (par ex. : diarrhée) apparaissent, persistent ou s'aggravent au-delà de trois (3) jours, cesser d'utiliser le produit et consulter un praticien en soins de santé. Ne pas utiliser ce produit si votre état de santé est immunocompromis (par ex. : sida, lymphome, traitement à long terme aux corticostéroïdes). Ne pas utiliser pour les enfants de 6 ans et moins.

Do not use if the safety seal under the cap is broken or missing. / N'utilisez pas le contenu si la fermeture de sécurité est endommagée ou absente.

Laboratory tested, quality guaranteed. Meets USP specifications for potency, uniformity, and disintegration, where applicable. / Ce produit est testé en laboratoire et sa qualité est garantie. Conforme, le cas échéant, aux normes USP en matière de puissance, d'homogénéité et de désintégration.

Manufactured for: / Fabriqué pour :

USANA Health Sciences, Inc., Salt Lake City, Utah 84120 USA

Distributed by: / Distribué par : USANA Canada Company

80 Innovation Drive, Woodbridge, Ontario L4H 0T2

Store below 25 °C / Conserver à une température inférieure à 25 °C.

Store in a light-resistant container. / À conserver dans un contenant opaque.

Made in USA / Fabriqué aux É.-U.

‡ Probiotic strains protected under patent US9192634B2 and patent pending WO2018065324A1, held by AB-BIOTICS, Inc. / ‡ Les souches probiotiques sont protégées en vertu du brevet des États-Unis US9192634B2 et du brevet en instance WO2018065324A1, détenus par AB-BIOTICS, Inc.